

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»
от «21» апреля 2022г.
№N051320

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование Медиаторн®

Международное непатентованное название Ипидакрин

Лекарственная форма, дозировка Таблетки, 20 мг

Фармакотерапевтическая группа

Нервная система. Психотропные. Препараты против деменции. Антихолинэстеразные препараты. Ипидакрин. Код АТХ N06DA05

Показания к применению

В составе комплексной терапии

- заболевания периферической нервной системы (неврит, полиневрит, полиневропатия, полирадикулоневропатия, миастения и миастенический синдром различной этиологии)
- бульбарные параличи и парезы
- в восстановительный период после органических поражений центральной нервной системы, сопровождающихся двигательными нарушениями
- демиелинизирующие заболевания нервной системы (в том числе рассеянный склероз)
- нарушения памяти различного происхождения (болезнь Альцгеймера, другие формы старческого слабоумия)
- атония кишечника

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав»
- эпилепсия
- экстрапирамидные заболевания с гиперкинезом
- стенокардия
- выраженная брадикардия
- бронхиальная астма
- непроходимость кишечника или мочевыводящих путей
- вестибулярные расстройства
- язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения
- период беременности и кормления грудью
- детский и подростковый возраст до 18 лет (адекватные исследования по изучению безопасности лекарственного средства у детей не проведены)

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Медиаторн® усиливает седативный эффект в комбинации со средствами, угнетающими центральную нервную систему. Действие и побочные эффекты усиливаются при совместном применении с другими ингибиторами холинэстеразы и М-холиномиметическими средствами.

У пациентов с *Myasthenia gravis* увеличивается риск развития холинергического криза, если применять Медиаторн® одновременно с другими холинергическими средствами. Возрастает риск развития брадикардии, если β -адреноблокаторы применялись до начала лечения Медиаторном.

Церебролизин повышает эффективность препарата Медиаторн®.

Алкоголь усиливает побочные эффекты препарата.

Специальные предупреждения

С осторожностью назначать при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, тиреотоксикозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также пациентам с заболеваниями дыхательных путей в анамнезе или при острых заболеваниях дыхательных путей.

Препарат содержит лактозу. Не следует применять пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом *Lapp* лактазы или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Применение в педиатрии

Безопасность применения данного лекарственного средства у детей и подростков в возрасте до 18 лет до настоящего времени не доказана.

Во время беременности или лактации

Препарат усиливает тонус матки и может вызвать преждевременную родовую деятельность, поэтому во время беременности применение противопоказано.

Данное лекарственное средство нельзя применять кормящим матерям.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Медиаторн® может оказывать седативное действие, поэтому лицам, у которых наблюдаются побочные явления со стороны центральной нервной системы, например, сонливость, следует воздержаться от управления транспортным средством.

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Дозы и длительность лечения определяются индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания.

Заболевания периферической нервной системы, миастения и миастенический синдром

Внутрь по 10-20 мг 1-3 раза в день.

Курс лечения составляет от одного до двух месяцев. При необходимости курс лечения можно повторить несколько раз с перерывом между курсами в 1-2 месяца.

Для предотвращения миастенических кризов при тяжелых нарушениях нервно-мышечной проводимости кратковременно парентерально вводят ипидакрина гидрохлорид, в форме раствора для инъекций. Затем лечение продолжают таблетированной формой с увеличением дозы до 20-40 мг 5-6 раз в день.

Нарушения памяти различного происхождения (болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия)

Дозу и продолжительность лечения устанавливают индивидуально. Максимальная суточная доза иногда может достигать 200 мг. Курс лечения – от одного месяца до одного года.

Лечение и профилактика атонии кишечника

20 мг 2-3 раза в день в течение 1-2 недель.

Метод и путь введения

Таблетки принимают внутрь. Таблетку необходимо проглотить, запивая водой.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Симптомы

При тяжелой передозировке может развиваться «холинергический криз», симптомами которого являются бронхоспазмы, слезоточивость глаз, повышенное потоотделение, суженные зрачки, нистагм, спонтанная дефекация и мочеиспускание, рвота, брадикардия, блокада сердца, аритмия, гипотензия, беспокойство, тревога, возбужденность, чувство страха, атаксия, неразборчивая речь, сонливость, слабость, конвульсии, кома. Симптомы могут быть слабо выражены.

Лечение

В случае отравления или при относительной передозировке препарата применяют симптоматическую терапию. Применяют М-холиноблокаторы: атропин, тригексифенидил, метацин и др.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Для разъяснения способа применения лекарственного препарата рекомендуется обратиться к медицинскому работнику.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Часто

- гиперсаливация, тошнота
- сердцебиение, брадикардия
- усиленное потоотделение

Нечасто

- усиленное выделение секрета бронхов
- после применения высоких доз – головокружение, головная боль, слабость, сонливость, мышечные судороги, кожные аллергические реакции (кожный зуд, сыпь), рвота

Редко

- боли в эпигастрии, понос

Неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным)

- бронхоспазм
- реакции гиперчувствительности (включая аллергический дерматит, анафилактический шок, астму, токсический эпидермальный некролиз, эритему, крапивницу, свистящее дыхание, отек гортани)

Слюнотечение и брадикардию можно уменьшить м-холиноблокаторами (атропин и др.).

В этих случаях уменьшают дозу или кратковременно (на 1-2 дня) прерывают прием препарата.

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

Одна таблетка содержит

активное вещество: ипидакрина гидрохлорида моногидрат 20,0 мг,

вспомогательные вещества: лактозы, моногидрат; крахмал картофельный; кальция стеарат.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Таблетки белого или почти белого цвета, круглой формы с плоской поверхностью, с фаской.

Форма выпуска и упаковка

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной (бесцветной, прозрачной) и фольги алюминиевой с печатью, лакированной.

5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Срок хранения 2 года

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек По рецепту

Сведения о производителе

ПАО «Киевмедпрепарат», Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

тел/факс: +38-044-490-75-22, E-mail: office@arterium.ua

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «АРТЕРИУМ ЛТД», Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

тел/факс: +38-044-490-75-22, E-mail: office@arterium.ua

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «ТД Фармамед», г. Алматы, улица Ходжанова, здание 67, н.п. 4а

Тел.: +7 (727) 344-99-05/06, E-mail: Almaty@pharmamed.kz

«Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық бақылау
комитеті» РММ төрағасының
2022 ж. «21» сәуір
№N051320 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

**Дәрілік препаратты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)**

Саудалық атауы Медиаторн®

Халықаралық патенттелмеген атауы Ипидакрин

Дәрілік түрі, дозасы Таблеткалар, 20 мг

Фармакотерапиялық тобы

Жүйке жүйесі. Психоаналептикер. Деменцияға қарсы препараттар. Антихолинестеразды препараттар. Ипидакрин. АТХ коды N06DA05

4.1 Қолданылуы

Кешенді ем құрамында

- шеткері жүйке жүйесінің аурулары (неврит, полиневрит, полиневропатия, полирадикулоневропатия, миастения және этиологиясы әртүрлі миастениялық синдром)
- бульбарлы паралич және парез
- орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдануынан кейінгі қалпына келтіру кезеңінде, қозғалыс бұзылыстарымен қатар жүреді
- жүйке жүйесінің демиелинизациялық аурулары (оның ішінде жайылған склероз)
- есте сақтаудың шығу тегі әртүрлі бұзылуы (Альцгеймер ауруы, кәрілік деменцияның басқа түрлері)
- ішек атониясы

Қолдану басталғанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- әсер етуші затқа немесе «Құрамы» бөлімінде аталған қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық
- эпилепсия
- гиперкинезі бар экстрапирамидалық аурулар
- стенокардия
- айқын брадикардия
- бронх демікпесі
- ішек немесе несеп шығару жолдарының бітелуі
- вестибулярлық бұзылыстар
- асқыну сатысындағы асқазанның немесе он екі елі ішектің ойық жарасы
- жүктілік және бала емізу кезеңі
- 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер (балалардағы дәрілік заттың қауіпсіздігін тексеру бойынша талапқа сай зерттеулер жүргізілген жоқ)

Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесу

Медиаторн® орталық жүйке жүйесін тежейтін дәрілермен біріктірілімде седативті әсерді күшейтеді. Холинэстеразаның басқа тежегіштерімен және М-холиномиметикалық дәрілермен бірге қолданғанда әсері мен жағымсыз әсерлері күшейеді.

Myasthenia gravis бар пациенттерде Медиаторн® басқа холинергиялық дәрілермен бір мезгілде қолданылса, холинергиялық криздің даму қаупі артады. β-Адреноблокаторлар Медиаторнмен емдеу басталғанға дейін қолданылса, брадикардияның даму қаупі артады.

Церебролизин Медиаторн® препаратының тиімділігін арттырады.

Алкоголь препараттың жағымсыз әсерлерін күшейтеді.

Арнайы ескертулер

Асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы, тиротоксикоз, жүрек-қантамыр жүйесі аурулары, сондай-ақ анамнезде тыныс алу жолдарының аурулары бар немесе жедел тыныс алу жолдарының аурулары бар пациенттерге сақтықпен тағайындау керек.

Препарат құрамында лактоза бар. Сирек туа біткен галактоза жақпаушылығы, *Lapp* лактаза тапшылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар пациенттерге қолдануға болмайды.

Педиатрияда қолдану

Осы дәрілік затты 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерде қолдану қауіпсіздігі осы уақытқа дейін дәлелденген жоқ.

Жүктілік немесе лактация кезінде

Препарат жатырдың тонусын күшейтеді және мерзімінен бұрын босануды тудыруы мүмкін, сондықтан жүктілік кезінде қолдануға болмайды.

Бұл препаратты бала емізетін аналарға қолдануға болмайды.

Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Медиаторн® седативті әсер етуі мүмкін, сондықтан орталық жүйке жүйесі жағынан, мысалы, ұйқышылдық сияқты жағымсыз әсерлер байқалатын адамдар көлік құралын басқарудан бас тарта тұрғандары жөн.

Қолдану бойынша ұсынымдар

Дозалау режимі

Дозалары мен емдеу ұзақтығы аурудың ауырлығына байланысты жеке анықталады.

Шеткері жүйке жүйесінің аурулары, миастения және миастениялық синдром

Ішке, күніне 1-3 рет 10-20 мг.

Емдеу курсы бір айдан екі айға дейін. Қажет болса, емдеу курсына курстар арасындағы 1-2 ай үзіліспен бірнеше рет қайталауға болады.

Жүйке-бұлшықет өткізгіштігінің ауыр бұзылуларында миастениялық криздердің алдын алу үшін қысқа уақыт ішінде ипидакрин гидрохлориді инъекцияға арналған ерітінді түрінде парентеральді түрде енгізіледі. Содан кейін емді таблеткаланған түрімен дозаны күніне 5-6 рет 20-40 мг дейін арттырумен жалғастырады.

Есте сақтаудың шығу тегі әртүрлі бұзылуы (Альцгеймер ауруы, кәрілік деменцияның басқа түрлері)

Емдеудің дозасы мен ұзақтығын жеке белгілейді. Ең жоғары тәуліктік доза кейде 200 мг жетуі мүмкін. Емдеу курсы – бір айдан бір жылға дейін.

Ішек атониясын емдеу және профилактикасы

20 мг күніне 2-3 рет 1-2 апта бойы.

Енгізу әдісі мен жолы

Таблеткалар ішке қабылданады. Таблетканы сумен ішіп, жұту керек.

Артық дозалану жағдайында қабылдануы қажет шаралар

Симптомдары

Ауыр дозаланғанда «холинергиялық криз» дамуы мүмкін, оның симптомдары бронх түйілуі, көзден жас ағу, терлеудің жоғарылауы, көз қарашығының ұлғаюы, нистагм, өздігінен

болатын дефекация және несеп шығару, құсу, брадикардия, жүрек блокадасы, аритмия, гипотензия, мазасыздық, мазасыздық, қозу, қорқыныш сезімі, атаксия, түсініксіз сөйлеу, ұйқышылдық, әлсіздік, конвульсия, кома. Симптомдар жұмсақ болуы мүмкін.

Емі

Улану немесе препараттың салыстырмалы дозалануы жағдайында симптоматикалық ем қолданылады. М-холиноблокаторлар қолданылады: атропин, тригексифенидил, метацин және т. б.

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина қызметкеріне кеңес алуға жүгіну бойынша ұсынымдар

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина қызметкеріне жүгіну ұсынылады.

ДП стандартты қолдану кезінде пайда болатын жағымсыз реакциялардың сипаттамасы және бұл жағдайда қабылдануы тиіс шаралар

Жиі

- сілекейдің көп бөлінуі, жүрек айнуы
- жүректің қағуы, брадикардия
- қатты терлеу

Жиі емес

- бронх секреті бөлінуінің күшеюі
- жоғары дозаларды қолданғаннан кейін – бас айналу, бас ауыру, әлсіздік, ұйқышылдық, бұлшықет құрысулары, терінің аллергиялық реакциялары (терінің қышынуы, бөртпе), құсу

Сирек

- эпигастрийдегі ауырсыну, іш өту

Белгісіз (қолда бар деректер бойынша анықтау мүмкін емес)

- бронх түйілуі
- аса жоғары сезімталдық реакциялары (аллергиялық дерматитті, анафилаксиялық шок, демікпе, уытты эпидермальді некролизді, эритеманы, есекжемді, ысқырып тыныс алуды, көмейдің ісінуін қоса)

Сілекей бөліну мен брадикардияны м-холиноблокаторлармен (атропин және т.б.) азайтуға болады.

Мұндай жағдайларда дозаны азайтады немесе препаратты қабылдауды қысқа мерзіге (1-2 күнге) тоқтатады.

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина қызметкеріне, фармацевтика қызметкеріне немесе дәрілік препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса алғанда, дәрілік препараттарға жағымсыз реакциялар (әсерлер) бойынша тікелей ақпараттық дерекқорға жүгіну керек

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК

<http://www.ndda.kz>

Қосымша мәліметтер

Дәрілік препараттың құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат: ипидакрин гидрохлориді моногидраты 20,0 мг,

қосымша заттар: лактоза моногидраты; картоп крахмалы; кальций стеараты.

Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы

Тегіс беткейлі, ойығы бар дөңгелек пішінді, ақ немесе ақ дерлік түсті таблеткалар.

6.5 Шығарылу түрі және қаптамасы

10 таблеткадан поливинилхлоридті (түссіз, мөлдір) үлбірден және лакталған, баспалы алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.

5 пішінді ұяшықты қаптама медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Сақтау мерзімі

2 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

6.7 Дәріханалардан босатылу шарттары Рецепт арқылы

Өндіруші туралы мәліметтер

«Киевмедпрепарат» ЖАҚ, Украина, 01032, Киев қ., Саксаганский к-сі, 139.

тел/факс: +38-044-490-75-22, E-mail: office@arterium.ua

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

«АРТЕРИУМ ЛТД» ЖШҚ, Украина, 01032, Киев қ., Саксаганский к-сі, 139.

тел/факс: +38-044-490-75-22, E-mail: office@arterium.ua

Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан дәрілік заттардың сапасы жөнінде шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және дәрілік заттың қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі бақылауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта)

«ТД Фармамед» ЖШС, Алматы қ., Ходжанов көшесі, 67 ғимарат, т.е. 4а

Тел.: +7 (727) 344-99-05/06, E-mail: Almaty@pharmamed.kz